



## Circulaire n°116

Le 16/07/2010

### DÉSHERBAGE D'ÉTÉ

#### DESCRIPTION DES PRODUITS ANTIDICOTYLÉDONES

Embutone RL 400 - Nouvelle formulation - (composition 400 g/L de 2-4 DB)

Embutone RL—Ancienne formulation - (composition 300 g/L de 2-4 DB)

**1 L Embutone RL = 0,75 L Embutone RL 400**

1 application maximum par an, usage autorisé à la dose de 4,5 L/ha maximum, DAR de 60 jours (ZNT 5 mètres).

Efficace sur repousses de colzas, chénopodes, sanves...

Ne pas traiter en bordure de vignes.

Basagran SG (composition 87 % de Bentazone)

Usage autorisé à la dose maximum de 0,8 kg/ha, DAR de 60 jours (ZNT 5 mètres).

Efficace sur capselles, matricaires.

Adagio SG, équivalent à Basagran SG

Lentagran (composition 45 % de pyridate)

Usage autorisé à la dose maximum de 2 kg/ha, DAR 28 jours, 1 application maximum par an mais application fractionnée possible.

Efficace sur gaillet, chénopodes, mercuriales.

#### APPLICATION CONTRE LES DICOTYLÉDONES

*Pas de traitement par température > à 25°C  
Nécessité d'une bonne hygrométrie  
Volume d'application 300 l/ha*

Application au stade feuille cotylédonnaire à 1 feuille trifoliée de la luzerne

Lentagran 0,5 kg + Embutone RL 400 1,9 L\*

Ou

Basagran SG 0,3 kg + Embutone RL 400 1,9 L\*

Ou

Lentagran 0,5 kg + Basagran SG 0,3 kg

*Traitement pouvant être répété 1 fois*

Colzas, chénopodes,  
amarantes

\* Concernant l'Embutone, une seule application est possible par an. A un stade précoce, en petite dose, il existe un risque de non destruction suite à des levées échelonnées d'adventices.

A la demande de la profession, la règle actuelle d'une seule application possible par an pourrait être modifiée dans les semaines à venir pour permettre le traitement à dose fractionnée en deux applications et donc dans le respect de la dose totale maximum autorisée par hectare, par an.

Nous vous informerons par circulaire de toute modification de cette règle.



Application au stade 1-2 feuilles trifoliées de la luzerne

Basagran SG 0,4 à 0,6 kg/ha + Embutone RL 400 3 L à 3,75 L/ha

Ou

Lentagran 1 kg + Embutone RL 400 3 à 3,75 L/ha

Ou

Lentagran 1 kg + Basagran SG 0,4 à 0,6 kg/ha

Ou

Embutone RL 400 à 4,5 L/ha

Application contre les graminées (repousses d'escourgeon...)

Détruire les graminées à partir du stade 3 feuilles de la repousse. Attendre que le maximum de repousses soient levées mais intervenir avant qu'elles ne concurrencent trop la luzerne. Les produits commerciaux disponibles sont à base de quizalofop éthyl (Targa D+), clétodime (Ogive) et cycloxydine (Stratos Ultra).

Ogive à partir de 0,4 L/ha (DAR 240 jours)

Ou

Targa D+ (ou Pilot) à partir de 0,4 L/ha + huile

Ou

Stratos Ultra à partir de 2 L/ha

**Avertissement**

**Consulter l'étiquetage du bidon avant toute décision d'application et ce quel que soit le produit. Respecter rigoureusement l'homologation, les consignes d'application et plus particulièrement vérifier les délais avant récolte.**

**Pour tout complément d'information concernant l'homologation des produits commerciaux, consulter la base e-phy sur <http://e-phy.agriculture.gouv.fr>, rubrique usage luzerne.**

**A SURVEILLER**

Les premières morsures de sitones sont signalées sur jeunes semis. Restez vigilant à la levée pour les parcelles en bordure de légumineuses (pois protéagineux, luzerne...) ou dans les parcelles avec présence de résidus de pailles en surface.

